

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI KIVONATA

Az őz (*Capreolus capreolus*) etetőhely használatának vizsgálata kameracsapdázással **Györffy András Hunor**

Vadgazda mérnöki, alapképzés, levelező

Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

A vadtakarmányozás bevett gyakorlat a legtöbb hazai vadászatra jogosult körében, azonban a kijuttatott takarmány hasznosulása tudományosan kevésbé bizonyított. Hogy ebben a kérdésben állást tudjunk foglalni, szükséges a vadfajok etetőhasználatát mélyrehatóan tanulmányozni. A dolgozatban leggyakoribb nagyvadfajunknak, az őznek az etetőhasználatát vizsgáltam.

Céлом volt meghatározni az etetőátogatások számát, hosszát és az etetőt látogató őzek csoportméretét és ivararányát. Emellett vizsgáltam a takarmányt fogyasztó őzek arányát, az őzek napi aktivitási ciklusának alakulását.

Az adatgyűjtés alföldi őzes területen zajlott a teljes etetési időszak alatt. Három őz abraketető mellé kihelyezett vadkamerák által készített képeket dolgoztam fel és értékeltem az adatokat.

A bevezetésben kifejtett kérdéseket sikerült megválaszolni, és az általam gyűjtött adatok további elemzésekre is alkalmasak lehetnek. Az eredmények nagyrészt egybevágnak a korábbi kutatásokban és szakirodalmakban találtakkal. Az etetők napi átlagos látogatottsága között akár háromszoros különbség is lehetett, az etetőn töltött napi átlagos idő esetén pedig akár hétszeres is. Az etetőlátogatások átlagos hosszában nem volt nagy különbség az etetők és a hónapok között, viszont ezeknek az adatoknak igen nagy a szórása. Január hónapban volt a legnagyobb aktivitás tapasztalható az etetőlátogatások számát, hosszát és a táplálkozó őzek arányát tekintve is. Az őzek átlagosan az etetőn töltött idejük közel negyedét töltötték a kijuttatott takarmány fogyasztásával. Az etetőkön a bakok összességében több időt töltöttek a sutáknál. Az őzek napi aktivitására 3-5 csúcs jellemző, az alkonyati és esti csúcsok nagyobbak voltak a hajnalinál.

A dolgozat eredményei mind az őztakarmányozással kapcsolatos további kutatásokhoz, mind a vadászatra jogosultaknak használható információt és objektív támpontot adhatnak.